

Protocolo para Bloqueios/ Denervação/ Rizotomia Percutânea em Coluna



Dados do Paciente

Nome	Número da carteira da Unimed
------	------------------------------

Nome do médico assistente

Códigos de procedimentos solicitados

.....

.....

.....

Segmento solicitado

.....

.....

1. Tem limitações físicas das atividades de vida diária (AVD'S)?

Sim Não

2. Há quanto tempo apresenta limitações das AVD'S?

.....

.....

3. Fez tratamento conservador?

Sim Não

4. Quais e por quanto tempo?

.....

.....

5. Tem hérnia discal?

Sim Não

OBS: Conforme Nota Técnica nº 95 da ANS de 2015 os termos protrusão, abaulamento, extrusão e sequestro são análogos a hérnia discal para fins de cumprimento da Diretriz de Utilização nº 60, portanto, NÃO possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência á saúde regulados pela Lei nº 9.656/98.

6. Tem sinais de estenose ou instabilidade cirúrgica?

Sim Não

7. Tem cirurgia prévia no segmento a ser tratado?

Sim Não

Se sim, quais?

.....

.....

8. Já realizou bloqueio anestésico facetário ou foraminal antes? Qual resultado? (% de melhora)

.....

.....

Nome do (a) Dr. (a)	Especialidade
CRM	Data

Protocolo para Bloqueios/ Denervação/ Rizotomia Percutânea em Coluna



O procedimento tem indicação nos seguintes cenários:

1. Dor Radicular Lombar:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

2. Claudicação Neurogênica:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

3. Dor Lombar Baixa, sem sintomas em membros inferiores apenas se:

- Atletas de alto rendimento durante o período de competição
- Grávidas com dor lombar que não respondem a outras formas de tratamento

Não mais que duas injeções na mesma sessão, 3 em 06 meses, 6 em 1 ano. As duas injeções da mesma sessão podem ser bilaterais em um único nível ou, unilaterais em dois níveis.